



พันธุศาสตร์โมเลกุล

ดร. ธัชชา ศุภระจันทร์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพันธุศาสตร์โมเลกุลในประเด็นต่อไปนี้

1. สารพันธุกรรม

- การทดลองที่ยืนยันว่า DNA เป็นสารพันธุกรรม
- คุณสมบัติ หน่วยย่อยของกรดนิวคลีอิก
- โครงสร้าง DNA และ RNA

2. การจำลองตัวเองของ DNA

- การจำลองตัวเองแบบกึ่งอนุรักษ์
- โพรตีนและเอนไซม์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง


3. DNA ทำให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมได้อย่างไร

- The central dogma
- กลไก Transcription
- กลไก Translation

4. การควบคุมการทำงานของยีน (gene regulation)

- ระดับ DNA
- ระดับ RNA
- ระดับ protein

ตำราสำหรับอ่านเพิ่มเติม



1. สารพันธุกรรม

คุณสมบัติของสารพันธุกรรม

- สามารถเก็บข้อมูลทางพันธุกรรม (genetic information) ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตไว้ได้
- สามารถแสดงลักษณะต่างๆ ตามข้อมูลทางพันธุกรรม (expression) ที่เก็บไว้ได้
- สามารถถ่ายทอด (transmission) ข้อมูลทางพันธุกรรมไปสู่เซลล์รุ่นต่อไปได้
- สามารถจำลองตัว (replication) เพื่อให้ได้โมเลกุลใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ
- มีโครงสร้างค่อนข้างถาวร แต่สามารถเกิด variation อันเนื่องมาจากเกิด mutation ได้ด้วยความถี่ค่อนข้างต่ำ


การทดลองที่ยืนยันว่ากรดนิวคลีอิกคือสารพันธุกรรม

Alfred Hershey และ Martha Chase, 1952

คำถาม : อะไรคือสารพันธุกรรม โปรตีน หรือ ดีเอ็นเอ

การทดลอง : ใช้การบุกรุกของไวรัส bacteriophage T2 เข้าเซลล์แบคทีเรีย *E.Coli* โดยติดฉลากโมเลกุลโปรตีน และ ดีเอ็นเอ ด้วยสารกัมมันตรังสี

► **Figure 16.3** A virus infecting a bacterial cell. A phage called T2 attaches to a host cell and injects its genetic material through the plasma membrane, while the head and tail parts remain on the outer bacterial surface (colorized TEM).



Courtesy of Cold Spring Harbor Laboratory Archives. Noncommercial, educational use only.

1 Mixed radioactively labeled phages with bacteria. The phages infected the bacterial cells.



2 Agitated the mixture in a blender to free phage parts outside the cells.

3 Centrifuged the mixture so that bacteria formed a pellet at the bottom of the test tube; free phages and phage parts, which are lighter, remained suspended in the liquid.


4 Measured the radioactivity in the pellet and the liquid.

Batch 1: Phages were grown with radioactive sulfur (^{35}S), which was incorporated into phage protein (pink).

^{35}S





Centrifuge




Batch 2: Phages were grown with radioactive phosphorus (^{32}P), which was incorporated into phage DNA (blue).

^{32}P



Centrifuge



Results When proteins were labeled (batch 1), radioactivity remained outside the cells, but when DNA was labeled (batch 2), radioactivity was found inside the cells. Bacterial cells containing radioactive phage DNA released new phages with some radioactive phosphorus.

Conclusion Phage DNA entered bacterial cells, but phage proteins did not. Hershey and Chase concluded that DNA, not protein, functions as the genetic material of phage T2.


Source: A. D. Hershey and M. Chase, Independent functions of viral protein and nucleic acid in growth of bacteriophage, *Journal of General Physiology* 36:39-56 (1952).

WHAT IF? How would the results have differed if proteins carried the genetic information?

DNA ทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรมของฟาจ T2


โครงสร้างของกรดนิวคลีอิก

กรดนิวคลีอิกมี 2 ชนิด



1. Ribonucleic acid (RNA)
2. Deoxyribonucleic acid (DNA)

Nucleotide เป็นหน่วยย่อยของกรดนิวคลีอิก





องค์ประกอบของ nucleotide คือ

polynucleotide

1. Pentose sugar
2. Nitrogenous base
3. Phosphate group



1. Pentose sugar



น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม

2. Nitrogenous base

PURINES



PYRIMIDINES









Figure 2-17
Molecular Cell Biology, Sixth Edition
© 2008 W.H. Freeman and Company

3. Phosphate group



Sugar-phosphate backbone


Nitrogenous bases



nucleotide มาต่อกันด้วยพันธะ
phosphodiester bound
กลายเป็น polynucleotide

Sugar-phosphate backbone

Nitrogenous bases



polynucleotide


5' end phosphate



3' end hydroxyl group

โครงสร้างของ DNA

ประกอบด้วย polynucleotides 2 สายที่เรียงตัวในทิศทางตรงกันข้าม (antiparallel) พันเป็นเกลียววนขวา (Watson-Crick, 1953)



A จับกับ T

C จับกับ G

Complementary base pairing



เบสคู่สมของสองสายนิวคลีโอไทด์จับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน

ใน 1 เกลียวของดีเอ็นเอยาว 3.4 nm และ 1 คู่เบสยาว 0.34 nm
ถามว่า 1 เกลียวดีเอ็นเอ มีเบสกี่คู่

นักศึกษาคิดว่าแรงยึดระหว่างการจับกันของเบสคู่ไหนมีความแข็งแรงมากกว่ากัน

โครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA ประกอบด้วย major groove

และ minor groove



The discovery of 3D structure of DNA



Francis Harry
Compton Crick
(1916-2004)




James Dewey
Watson
(1928 -)




Maurice Hugh
Frederick Wilkins
(1916-2004)



(a) Rosalind Franklin




(b) Franklin's X-ray diffraction
photograph of DNA



โครงสร้างของ RNA

- ประกอบด้วย polynucleotide 1 สาย
- แต่ละ ribonucleotide ประกอบด้วย
 1. Ribose sugar
 2. Nitrogenous base (A, U, G และ C)
 3. Phosphate group



(b) Primary structure


5' AUGCGGCUACGUAACGAGCUUAGCGGGUAUACCGAAAGGGUAGAAC 3'

An RNA molecule folds to form secondary structures...

Folding

...owing to hydrogen bonding between complementary bases on the same strand.

Secondary structure



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพันธุศาสตร์โมเลกุลในประเด็นต่อไปนี้

1. สารพันธุกรรม

- การทดลองที่ยืนยันว่า DNA เป็นสารพันธุกรรม
- คุณสมบัติ หน่วยย่อยของกรดนิวคลีอิก
- โครงสร้าง DNA และ RNA

2. การจำลองตัวเองของ DNA

- การจำลองตัวเองแบบกึ่งอนุรักษ์
- โพรตีนและเอนไซม์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3. DNA ทำให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมได้อย่างไร


- The central dogma
- กลไก Transcription
- กลไก Translation

4. การควบคุมการทำงานของยีน (gene regulation)


- ระดับ DNA
- ระดับ RNA
- ระดับ protein

2. การจำลองโมเลกุลของ DNA (DNA replication)


Watson and Crick's model : the semiconservative model



(a) The parental molecule has two complementary strands of DNA. Each base is paired by hydrogen bonding with its specific partner, A with T and G with C.




(b) The first step in replication is separation of the two DNA strands. Each parental strand can now serve as a template that determines the order of nucleotides along a new, complementary strand.




(c) The complementary nucleotides line up and are connected to form the sugar-phosphate backbones of the new strands. Each "daughter" DNA molecule consists of one parental strand (dark blue) and one new strand (light blue).

Parent cell First replication Second replication


(a) Conservative model. The two parental strands reassociate after acting as templates for new strands, thus restoring the parental double helix.



(b) Semiconservative model. The two strands of the parental molecule separate, and each functions as a template for synthesis of a new, complementary strand.



(c) Dispersive model. Each strand of *both* daughter molecules contains a mixture of old and newly synthesized DNA.



แบบของการจำลองโมเลกุลดีเอ็นเอ

สมมุติฐาน


- Conservative model
- Semiconservative model
- Dispersive model

แล้วแบบไหนคือแบบที่ถูกต้อง


การทดลองของ Meselson และ Stahl (1958) สนับสนุนการจำลองดีเอ็นเอแบบกึ่งอนุรักษ์ (semiconservative model)

Parent cell First replication Second replication




(a) Conservative model. The two parental strands reassociate after acting as templates for new strands, thus restoring the parental double helix.



(b) Semiconservative model. The two strands of the parental molecule separate, and each functions as a template for synthesis of a new, complementary strand.





(c) Dispersive model. Each strand of both daughter molecules contains a mixture of old and newly synthesized DNA.



Origin of replication



จุดเริ่มต้นของการจำลองโมเลกุลดีเอ็นเอ (origin of replication) ระหว่างโปรแคริโอตและยูแคริโอตมีความแตกต่างกันอย่างไร

(a) Origin of replication in an *E. coli* cell



In the circular chromosome of *E. coli* and many other bacteria, only one origin of replication is present. The parental strands separate at the origin, forming a replication bubble with two forks. Replication proceeds in both directions until the forks meet on the other side, resulting in two daughter DNA molecules. The TEM shows a bacterial chromosome with a replication bubble. New and old strands cannot be seen individually in the TEMs.

(b) Origins of replication in a eukaryotic cell





In each linear chromosome of eukaryotes, DNA replication begins when replication bubbles form at many sites along the giant DNA molecule. The bubbles expand as replication proceeds in both directions. Eventually, the bubbles fuse and synthesis of the daughter strands is complete. The TEM shows three replication bubbles along the DNA of a cultured Chinese hamster cell.

DRAW IT In the TEM in (b), add arrows for the third bubble.

กลไกการจำลองดีเอ็นเอสายใหม่


- ต้องมี RNA primer
- RNA primer ถูกสร้างโดย RNA primase (prokaryote) หรือ DNA polymerase α (eukaryote)



ทิศทางการสังเคราะห์สายใหม่จะเกิดจากด้าน 5' end ไปด้าน 3' end เสมอ


ดีเอ็นเอสายแม่แบบจะมีทิศทางจาก 3' end ไปด้าน 5' end เสมอ

การสร้างดีเอ็นเอสายใหม่สองสายจะแตกต่างกัน สายหนึ่งสร้างต่อเนื่องเป็นสายยาว เรียกดีเอ็นเอสายนำ (**leading strand**) อีกสายไม่สามารถต่อเป็นสายยาวได้ เพราะทิศทางการสร้างสวนทางกับการคลายเกลียวดีเอ็นเอ จึงสร้างเป็นสายสั้นๆ เรียก (**lagging strand**) หรือเรียกว่า ชิ้นส่วนโอคาซากิ (**Okazaki fragment**)




โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการจำลองดีเอ็นเอ

ตำแหน่งที่เกิด DNA replication เรียกว่า replication fork



Topoisomerase breaks, swivels, and rejoins the parental DNA ahead of the replication fork, relieving the strain caused by unwinding.

Primase synthesizes RNA primers, using the parental DNA as a template.



Helicase unwinds and separates the parental DNA strands.

Single-strand binding proteins stabilize the unwound parental strands.

▲ **Figure 16.13** Some of the proteins involved in the initiation of DNA replication. The same proteins function at both replication forks in a replication bubble. For simplicity, only the left-hand fork is shown, and the DNA bases are drawn much larger in relation to the proteins than they are in reality.


สรุปขั้นตอนการจำลองตัวของดีเอ็นเอ

1. ดีเอ็นเอสายคู่แยกออกจากกันโดยการทำงานของเอนไซม์เฮลิเคส (helicase)
2. Single strand DNA binding protein (SSB) มาเกาะที่ดีเอ็นเอสายเดี่ยวที่แยกจากกันแล้วทั้งสองสาย เพื่อป้องกันไม่ให้ดีเอ็นเอที่แยกจากกันพันกลับเข้าที่เดิม
3. เมื่อสายดีเอ็นเอแม่แบบสองสายโป่งตัวแยกจากกัน จะทำให้เกิดเกลียวดีเอ็นเอที่ปลายสุดของโป่งยิ่งขดเกลียวแน่นขึ้น เอนไซม์โทโปไอโซเมอเรส (topoisomerase) จะทำหน้าที่คลายปมเหนือจุดแยกโดยใช้วิธีตัดสายดีเอ็นเอสายหนึ่งเพื่อคลายเกลียวแล้วต่อกลับเข้ากันใหม่
4. มีการใช้เอนไซม์ไพรมเอส (primase) สังเคราะห์อาร์เอ็นเอสายสั้นๆเรียกว่า RNA primer ซึ่งมีเบสคู่สมกับดีเอ็นเอแม่แบบมาเกาะกับสายดีเอ็นเอตรงบริเวณจุดเริ่มต้นในการสังเคราะห์สายใหม่
5. ดีเอ็นเอพอลิเมอเรส (DNA polymerase) จะนำนิวคลีโอไทด์ไตรฟอสเฟต (dATP dGTP dCTP หรือ dTTP) เข้ามาต่อกับอาร์เอ็นเอไพรมเมอร์ด้าน 3' ตามลำดับเบสคู่สมในดีเอ็นเอสายแม่แบบ


เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ นักศึกษาสามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอในยูทูป โดยค้นหา คำว่า DNA replication จะช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น

DNA replication


Filters About 283,000 results



✓ DNA Replication Animation - Super EASY
Medical Institution
3 years ago • 1,377,835 views
DNA Replication Animation ASSOCIATED VIDEOS & LINKS: -- Mitosis Video: <https://goo.gl/uf6hh4> -- Meiosis Video: ...




DNA Replication: The Cell's Extreme Team Sport
Amoeba Sisters
2 years ago • 1,083,268 views
Learn the steps of DNA replication, the enzymes involved, and what it means to be a leading or lagging strand! Check out our ...



DNA replication - 3D
yourgenome
1 year ago • 509,999 views
This 3D animation shows you how DNA is copied in a cell. It shows how both strands of the DNA helix are unzipped and copied to ...

การขดตัวของดีเอ็นเอเป็นแท่งโครโมโซม



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพันธุศาสตร์โมเลกุลในประเด็นต่อไปนี้

1. สารพันธุกรรม

- การทดลองที่ยืนยันว่า DNA เป็นสารพันธุกรรม
- คุณสมบัติ หน่วยย่อยของกรดนิวคลีอิก
- โครงสร้าง DNA และ RNA

2. การจำลองตัวเองของ DNA

- การจำลองตัวเองแบบกึ่งอนุรักษ์
- โพรตีนและเอนไซม์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3. DNA ทำให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมได้อย่างไร

- The central dogma
- กลไก Transcription
- กลไก Translation


4. การควบคุมการทำงานของยีน (gene regulation)

- ระดับ DNA
- ระดับ RNA
- ระดับ protein



3. DNA ทำให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมได้อย่างไร

- DNA เป็นเพียงแค่ที่เก็บข้อมูล
- ข้อมูลเหล่านี้ท้ายที่สุดจะต้องถูกนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีน

“The central dogma”




ตัวอย่างความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดแดงในคนที่เป็นโรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล์ (sickle cell anemia)




The change in amino acid sequence causes hemoglobin molecules to crystallize when oxygen levels in the blood are low. As a result, red blood cells sickle and get stuck in small blood vessels.

ความแตกต่างของการเกิด transcription และ translation ระหว่างโพรแคริโอตและยูแคริโอต



(a) Bacterial cell. In a bacterial cell, which lacks a nucleus, mRNA produced by transcription is immediately translated without additional processing.





(b) Eukaryotic cell. The nucleus provides a separate compartment for transcription. The original RNA transcript, called pre-mRNA, is processed in various ways before leaving the nucleus as mRNA.

การถอดรหัสจากดีเอ็นเอไปเป็นเมสเซนเจอร์อาร์เอ็นเอ (mRNA)

การถอดรหัส หรือ transcription

หมายถึง กระบวนการสังเคราะห์ RNA ที่มีการใช้ลำดับเบสจาก DNA ในบริเวณที่เป็นยีน เป็นแม่แบบ (template หรือ สาย antisense strand)




ยีน มีองค์ประกอบหลักคือ **promoter**, **RNA coding region** และ **terminator**

หัวใจหลักของ transcription



Transcription

- การสังเคราะห์ RNA อาศัยเอนไซม์ RNA polymerase เข้าจับที่ promoter
- สังเคราะห์ในทิศทาง 5' ไปยัง 3'
- สาย DNA แม่แบบ (template strand) คือสาย antisense (3' → 5')
- ลำดับเบสของสาย RNA ที่ถูกสร้าง จะเหมือนกับสาย coding strand (nontemplate strand หรือ sense strand)



กระบวนการ Transcription

1. Initiation
2. Elongation
3. Termination




ในยูแคริโอตจะมีกลุ่มโปรตีนที่เรียกว่า transcription factor มาจับกับ RNA polymerase ด้วย



1. Initiation

RNA polymerase ไปจับที่ promoter ตรงตำแหน่ง TATA box จากนั้นจึงเลื่อนไปยัง RNA coding region เริ่มกระบวนการ transcription






2. Elongation

การสังเคราะห์ RNA เกิดจากการทำงานของ RNA polymerase



rNTPs (ribonucleoside triphosphate)
Complementary base กับ template






3. Termination

- RNA polymerase สังเคราะห์ RNA ไปเรื่อยๆจะกระทั่งเจอรหัสหยุดที่เรียกว่า terminator บนสายดีเอ็นเอแม่แบบ
- RNA polymerase หลุดออกสิ้นสุดการสร้างสาย RNA



ชนิดของ RNA ที่ได้จาก transcription

1. Ribosomal RNA (rRNA)
2. Messenger RNA (mRNA)
3. Transfer RNA (tRNA)




1. tRNA

- เล็กสุดในบรรดา RNA มีขนาดประมาณ 73-93 นิวคลีโอไทด์
- ทำงานในกระบวนการ translation
- มีปลายด้าน 3' เป็นตำแหน่งเกาะของกรดอะมิโน
- มีลำดับเบสสามตัว เรียก anticodon ที่จับกับเบสคู่สมบน RNA



2. mRNA

- เป็นสายเดี่ยว ขนาดขึ้นอยู่กับยีน
- นำข้อมูลพันธุกรรมมาจากยีนในลักษณะของ Genetic code ในรูปของ Codon ที่ประกอบด้วยเบส 3 ตัวเรียงต่อกัน



		Second mRNA base						
		U	C	A	G			
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys
	UUC		UCC		UAC		UGC	
	UUA	Leu	UCA		UAA	Stop	UGA	Stop
	UUG		UCG		UAG	Stop	UGG	Trp
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg
	CUC		CCC		CAC		CGC	
	CUA		CCA		CAA	Gln	CGA	
	CUG		CCG		CAG		CGG	
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser
	AUC		ACC		AAC		AGC	
	AUA		ACA		AAA	Lys	AGA	Arg
	AUG	Met or start	ACG		AAG		AGG	
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly
	GUC		GCC		GAC		GGC	
	GUA		GCA		GAA	Glu	GGA	
	GUG		GCG		GAG		GGG	

ลักษณะทั่วไปของ genetic code


1. มีลักษณะเป็น ribonucleotide sequences
2. แต่ละรหัสประกอบด้วย ribonucleotide 3 หน่วย เรียกว่า triplet code
3. แต่ละรหัสกำหนดกรดอะมิโน 1 ชนิด
4. รหัสพันธุกรรมมีลักษณะเป็น degenerate code (กรดอะมิโนบางชนิด อาจมีรหัสได้มากกว่า 1 รหัส)
5. มี start codon และ stop codons
6. อ่านต่อเนื่องไม่มีการเว้นวรรค หรือกระโดดข้าม
7. ไม่มีการซ้อนทับ (non overlapping)
8. เป็นรหัสที่พบใน virus prokaryotes และ eukaryotes

		Second mRNA base				
		U	C	A	G	
U	U	UUU } Phe	UCU } Ser	UAU } Tyr	UGU } Cys	U C A G
	U	UUC } Phe	UCC } Ser	UAC } Tyr	UGC } Cys	
	U	UUA } Leu	UCA } Ser	UAA Stop	UGA Stop	
	U	UUG } Leu	UCG } Ser	UAG Stop	UGG Trp	
C	U	CUU } Leu	CCU } Pro	CAU } His	CGU } Arg	U C A G
	C	CUC } Leu	CCC } Pro	CAC } His	CGC } Arg	
	C	CUA } Leu	CCA } Pro	CAA } Gln	CGA } Arg	
	C	CUG } Leu	CCG } Pro	CAG } Gln	CGG } Arg	
A	U	AUU } Ile	ACU } Thr	AAU } Asn	AGU } Ser	U C A G
	A	AUC } Ile	ACC } Thr	AAC } Asn	AGC } Ser	
	A	AUA } Ile	ACA } Thr	AAA } Lys	AGA } Arg	
	A	AUG Met or start	ACG } Thr	AAG } Lys	AGG } Arg	
G	U	GUU } Val	GCU } Ala	GAU } Asp	GGU } Gly	U C A G
	G	GUC } Val	GCC } Ala	GAC } Asp	GGC } Gly	
	G	GUA } Val	GCA } Ala	GAA } Glu	GGA } Gly	
	G	GUG } Val	GCG } Ala	GAG } Glu	GGG } Gly	


3. rRNA

มีหลายขนาด ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของไรโบโซม

Prokaryote



Eukaryote



S = Svedberg Unit


ที่มา : Snustad and Simmons, 2006.

กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายหลังการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ (RNA processing) ในยูแคริโอต


เกิดใน mRNA ของ eukaryote

1. การตัด intron และต่อ exon
2. การเติม 5' cap (ใส่หมวก)
3. การเติม poly A tail (ต่อหาง)

RNA processing




1. การตัด intron และต่อ exon



2. การเติม 5' cap

- เป็นการเติมนิวคลีโอไทด์เพิ่มอีกหนึ่งหน่วยที่ปลาย 5' ของ mRNA
- นิวคลีโอไทด์ตัวนี้เป็น 7-methyl guanosine triphosphate




ทำไมต้องเติม 5' cap

- ช่วยเพิ่มความเสถียรของ mRNA
- เป็นตำแหน่งจดจำของโปรตีนบางตัวที่ทำงานในการ translation
- มีส่วนในกระบวนการตัด intron


3. การเติม poly A tail

เติมเบสอะดีนีน 50-250 นิวคลีโอไทด์ที่ด้าน 3' ของ mRNA



เพิ่มความมั่นคงให้กับสาย mRNA เพื่อให้ mRNA ไม่ถูกย่อยสลายโดยง่าย


“The central dogma”



การแปลรหัสจาก mRNA ไปเป็นโปรตีน (translation)


สิ่งที่จำเป็นในการแปลรหัส

- mRNA (ถอดรหัสออกมาจากส่วนที่เป็นยีนบนดีเอ็นเอ)
- tRNA with amino acids attached (tRNA ที่มีกรดอะมิโน)
- Ribosomes (ไรโบโซม ซึ่งประกอบด้วย rRNA และ โปรตีน)





กระบวนการ Translation

1. Initiation
2. Elongation
3. Termination



1. Initiation




1 A small ribosomal subunit binds to a molecule of mRNA. In a bacterial cell, the mRNA binding site on this subunit recognizes a specific nucleotide sequence on the mRNA just upstream of the start codon. An initiator tRNA, with the anticodon UAC, base-pairs with the start codon, AUG. This tRNA carries the amino acid methionine (Met).


2 The arrival of a large ribosomal subunit completes the initiation complex. Proteins called initiation factors (not shown) are required to bring all the translation components together. Hydrolysis of GTP provides the energy for the assembly. The initiator tRNA is in the P site; the A site is available to the tRNA bearing the next amino acid.

2. Elongation

Peptidyltransferase เป็นเอนไซม์ในไรโบโซมที่ทำหน้าที่ต่อกรดอะมิโนให้เป็นสาย polypeptide



3. Termination



Stop codon: UAA, UAG และ UGA


ดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ transcription และ translation ได้ในยูทูป

transcription



Filters ▾

About 1,200,000 results




Transcription

ndsuvirtualcell

8 years ago • 1,983,536 views

NDSU Virtual Cell Animations Project animation 'Transcription'. For more information please see <http://vcell.ndsu.edu/animations...>

CC




Transcription and Translation Overview

Armando Hasudungan

2 years ago • 580,875 views

<https://www.facebook.com/ArmandoHasudungan> Support me:

<http://www.patreon.com/armando> Instagram: ...




Transcription 1

khanacademymedicine

2 years ago • 251,534 views

Visit us (<http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine>) for health and medicine content or ...

CC




Transcription and mRNA processing | Biomolecules | MCAT | Khan Academy

Khan Academy

7 months ago • 79,188 views

Introduction to transcription including the role of RNA polymerase, promoters, terminators, introns and exons. Watch the next ...

CC



การถอดรหัส Transcription


NUTTINGMAN

3 years ago • 53,607 views



Filters ▾

About 7,190,000 results



Translation

ndsuvirtualcell

8 years ago • 2,062,978 views

NDSU Virtual Cell Animations project animation "Translation". For more information, see [http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations ...](http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations...)

CC



Translation


garlandscience

7 years ago • 521,869 views

To purchase the book:

<http://www.garlandscience.com/product/isbn/9780815344544> To see mo...

CC



Translation (mRNA to protein) | Biomolecules | MCAT | Khan Academy

Khan Academy ✓

7 months ago • 62,551 views

An deep dive into how mRNA is translated into proteins with the help of ribosomes and tRNA. Watch the next lesson: ...

CC

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพันธุศาสตร์โมเลกุลในประเด็นต่อไปนี้

1. สารพันธุกรรม

- การทดลองที่ยืนยันว่า DNA เป็นสารพันธุกรรม
- คุณสมบัติ หน่วยย่อยของกรดนิวคลีอิก
- โครงสร้าง DNA และ RNA

2. การจำลองตัวเองของ DNA

- การจำลองตัวเองแบบกึ่งอนุรักษ์
- โพรตีนและเอนไซม์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3. DNA ทำให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมได้อย่างไร

- The central dogma
- กลไก Transcription
- กลไก Translation

4. การควบคุมการทำงานของยีน (gene regulation)


- ระดับ DNA
- ระดับ RNA
- ระดับ protein

3. การควบคุมการทำงานของยีน (gene regulation)


1. การควบคุมการทำงานของยีนในโพรแคริโอต

Operon : ยีนหลายยีนที่อยู่ในวิถี metabolism เดียวกัน จะเรียงต่อกัน และมีการใช้โปรโมเตอร์ร่วมกัน

ภาพแสดงลักษณะของ *trp* operon ใน *E. coli*



การควบคุมการทำงานของ *trp* operon ใน *E. coli*




(b) Tryptophan present, repressor active, operon off. As tryptophan accumulates, it inhibits its own production by activating the repressor protein, which binds to the operator, blocking transcription.

2. การควบคุมการทำงานของยีนในยูแคริโอต

มีความซับซ้อนกว่าโพรแคริโอต ควบคุมได้ตั้งแต่ระดับดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน

1. ระดับโครงสร้างของดีเอ็นเอ
2. ระดับทรานสคริปชัน
3. ระดับหลังทรานสคริปชัน
4. อายุการทำงานของอาร์เอ็นเอ
5. ระดับทรานสเลชัน
6. ระดับหลังทรานสเลชัน



เอกสารอ้างอิง

Campbell, N.A. Reece, J.B. and Mitchell. L.G. 1999. Biology. 5th ed. Addison Wesley Longman, Inc. New York.

Freeman, S. 2011. Biological Science 4th ed. Benjamin Cummings, San Francisco.

Hartwell, L.H., Hood, L., Goldberg, M.L., Reynolds, A.E., Silver, L.M. and Veres, R.C. 2008. Genetics. From Gene to Genomes. Mc Graw Gill Companies, Inc. USA.

Lodish, H., Berk, A., Kaiser, C.A. and Krieger, M. 2008. Molecular Cell Biology 6th ed. W.H. Freeman and Company. New York.

Pierce, B.A. 2005. Genetics. A conceptual approach. W.H. Freeman and Company. New York.

Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. and Jackson, R.B. 2014. Campbell Biology 10th ed. Pearson. USA.

Tymoczko, J. L., Berg, J. M. and Stryer, L. 2013. Biochemistry, A short course 2nd ed. W.H. Freeman and Company. New York.

<http://www.differencebetween.net/science/difference-between-dna-and-rna/> สืบค้น

29 สิงหาคม 2559

<https://www.genome.gov/Glossary/index.cfm?id=32> สืบค้น 29 สิงหาคม 2559

แบบฝึกหัดที่ 1 เติมชื่อเอนไซม์ โครงสร้าง หรือกระบวนการต่อไปนี้

